

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

leu_high_light

اصول جداسازی

صحیح بیمار از

دستگاه ونتیلاتور

LIBERATION

FROM

VENTILATOR



شرایط بیمار برای وارد شدن


به پروسه ی *weaning*

leu_high_light

weaning

نکات بیمار برای وارد شدن به پرونده

- 1) Resolution Of The Reason For Intubation
- 2) Mental status → to protect the airway
- 3) Easy to intubation
- 4) Resource of manage an extubation
- 5) Hemodynamically stable , oxygenation & ventilation
- 6) patient on minimal setting → no vasopressors,
 $\text{FiO}_2 < 40\%$, $\text{PEEP} < 8$



- *Awakening trial*

- *Hold all sedatives*

اگر
قسمه ی این
نشر ایک
برقرار
جو:

نحوہ ی انجام

weaning

Breathing trial

- *Place on PSV* → *PS: 0-5*
PEEP: 5
FiO₂: 40%

or

- *T-Piece*
at least 30 min of observation





نمافوق Weaning

failure

- $RR < 8$ $OR > 35$
- $SpO_2 < 88\%$
- *Respiratory distress*
- *Marked agitation*
- *arrhythmia*
- *hypotension*



باتشكر از توجه شما

• گردآورنده: م. شـورابـے — کارشناس پرستاری

اردیبهشت ماه سال 1404