

بیمارستان شهدای هفتم تیر

نکات مهم در استفاده از

کلوگزاسیلین

تهیه و تنظیم : واحد آموزش بیمار
بیمارستان شهدای هفتم تیر

سایت بیمارستان :

WWW.HOSPHT.IUMS.AC.IR

شماره های تماس :

55228581 -4

داخلی - 331

تاریخ تهیه : دی ماه 98

تاریخ بازنگری : فروردین 99

تاریخ ابلاغ : دی ماه 98

فرد تایید کننده :

کلوگزامپولین چیست؟

یک آنتی بیوتیک از گروه پنی سیلین ها می باشد که با باکتریها مقابله می کند و در عفونت باکتریایی کاربرد دارد .

چطور از کپسول کلوگزامپولین استفاده کنیم؟

این دارو بصورت خوراکی طبق تجویز پزشک مصرف کنید .

- این دارو وقتی با معده خالی مصرف شود بهترین شرایط را برای جذب خواهد داشت (1 ساعت قبل و یا دوساعت بعد از غذا)
- برای اینکه دارو بهترین تاثیر را داشته باشد این آنتی بیوتیک را در فواصل زمانی مشخص مصرف کنید . برای اینکه زمان مصرف دارو یادتان بماند بهتر است هر روز در ساعت مشخصی مصرف شود .
- تا زمانیکه دوره درمانتان به اتمام نرسیده است مصرف این دارو را ادامه دهید حتی اگر علائم بیماریتان پس از چند روز از بین برود . توقف زود هنگام مصرف این دارو موجب میشود باکتریها به رشد خود ادامه دهند و در نتیجه موجب بروز مجدد عفونت می شود .

اگر مشکلاتان باقی ماند یا تشدید شد به پزشکتان اطلاع دهید .

عوارض مصرف کپسول کلوگزامپولین

ممکن است درد معده ، حالت تهوع ، استفراغ ، اسهال ، نفخ و خشک شدن دهان رخ دهد . اگر هر یک از این عوارض جانبی در شما تشدید شد بلافاصله به پزشک اطلاع دهید .

ممکن است زمان مصرف دارو به بیماری زبان مودار سیاه (زبان مودار سیاه به واسطه رشد باکتریها یا قارچ روی سطح پشتی زبان ایجاد می شود) دچار شوید . این بیماری بی خطر است و معمولا پس از درمان از بین می رود .
بهداشت دهانتان را به خوبی رعایت کنید و روزانه دو مرتبه با مسواک نرم روی زبانتان بکشید .

هشدارها :

- در صورت داشتن هر گونه سابقه واکنش های حساسیتی

به پنی سیلین ها این دارو را مصرف نکنید و پزشکتان را از این مسئله آگاه کنید .

- در صورت وجود سابقه ی بیماری گوارشی و عیب کار کلیه به پزشک حتما اطلاع دهید .

نکات قابل توجه در مورد مصرف کلوگزامپولین :

- در صورت فراموش کردن مصرف یک نوبت از دارو به محض بخاطر آوردن دوز فراموش شده را میل کنید . اما اگر تقریبا زمان نوبت بعد هم رسیده ، نوبت فراموش شده را رها کنید و مقدار را دو برابر نکنید .
- اگر در دوران بارداری یا شیردهی هستید به پزشک خود بگویید
- فهرست تمام داروهایی را که در حال استفاده از آن هستید (چه گیاهی ، چه پزشکی) در اختیار پزشک قرار دهید . ممکن است برخی از داروها ، اثر بخشی دارد را تحت تاثیر قرار دهد .
- چنانچه با مصرف دارو دچار علائمی چون تنفس سخت ، تورم صورت ، لب ها ، زبان یا گلو شدید مصرف دارو را قطع کرده و سریعا به اورژانس مراجعه نمایید .

--	--	--