

سفالکسین از دسته داروهای آنتی بیوتیک است و روی انواع مختلفی از باکتری ها اثر میکند.

این دارو معمولاً جهت درمان عفونت های مجاری ادراری، عفونت های پوستی، عفونت های مربوط به قفسه سینه، عفونت حلق، گوش و دندان تجویز می شود.

این دارو می تواند هم جهت درمان بزرگسالان و هم اطفال تجویز شود. افرادی که به پنی سیلین ها حساسیت دارند، ممکن است به این دارو نیز حساسیت داشته باشند. به همین دلیل پیش از شروع درمان در صورت حساسیت به هرگونه آنتی بیوتیک، پزشک خود را مطلع کنید.

اشکال دارویی

سفالکسین به صورت کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم و نیز به شکل پودر جهت تهیه سوسپانسیون خوراکی وجود دارد.

بسته های پودر به صورت ۱۲۵ میلی گرم و ۲۵۰ میلی گرم در ۵ میلی لیتر هستند.

شرایط نگهداری دارو

کپسول سفالکسین را باید در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کرد. سوسپانسیون سفالکسین را بعد از تهیه می توان تا ۱۴ روز در یخچال نگهداری کرد.

برای تهیه سوسپانسیون خوراکی سفالکسین باید پودر را کاملاً تکان دهید تا از هم باز شود و بعد از آب جوشیده سرد شده استفاده کنید و آب را تا خط نشانه روی ظرف بریزید. بعد باید شیشه را به خوبی تکان دهید تا به حالت سوسپانسیون درآید. ظرف دارو باید نیم ساعت به صورت ساکن بماند. که در این مدت سطح دارو از خط مورد نر پایین تر می آید که باید دوباره مقداری آب به آن بیفزایید.

دارو را باید در یخچال نگهداری کنید و پیش از هر بار مصرف ظرف سوسپانسیون را به خوبی تکان دهید.

نحوه ی تجویز و مصرف دارو

معمولاً این دارو بصورت ۴ کپسول در روز (هر ۶ ساعت ۱ عدد) تجویز می شود. مقدار مصرف بر اساس نوع عفونت توسط پزشک تعیین می شود

پزشک شما طول دوره درمان با این دارو را مشخص می کند و شما حتماً باید تا انتهای دوره ی درمان، دارو را بصورت منظم مصرف کنید.

معمولاً درمان با این دارو ۵ تا ۷ روزه می باشد اما ممکن است پزشک دوره ای کوتاه تر یا بلندتر از این میزان برای عفونت شما تجویز نماید.

در صورتی که احساس بهبودی داشته و علائم شما برطرف شد، نباید دارو را قطع کنید و باید آنتی بیوتیک ها را تا انتهای دوره ی درمان در ساعت مقرر مصرف کنید، در غیر این صورت دوره ی درمان کامل نشده و علاوه بر اینکه احتمال دارد علائم شما مجدداً آغاز شود، در بدن شما مقاومت دارویی در برابر این آنتی بیوتیک ایجاد می شود که باعث می شود در صورت ادامه ی این دارو پس از قطع کردن، دیگر تاثیری در درمان شما نداشته باشد.

این دارو با غذا تداخل خاصی ندارد و می توان آن را قبل یا بعد از غذا مصرف کرد. با این حال اگر کمی قبل از غذا مصرف شود، سریع تر اثر میکند.

بیمارستان شهدای هفتم تیر

نکات مهم در استفاده از

سفالکسین



تهیه و تنظیم: فاطمه مختاری

واحد آموزش به بیمار

سایت بیمارستان:

www.hosphd.iums.ac.ir

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با
شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

۵۵۲۲۸۵۸۱-۴

داخلی_331

خانم تیربند

در صورت فراموشی یک نوبت دارو بلافاصله آن را
مصرف نمایید اما از دوبرابر کردن مقدار دارو در
یک نوبت جدا خودداری کنید.

عوارض شایع سفالکسین

اسهال خفیف در ابتدای درمان از عوارض شایع
سفالکسین می باشد که خود به خود برطرف می
شود. در صورت وقوع آن مایعات به مقدار کافی
مصرف نمایید اما در صورت ادامه دار شدن اسهال
بیشتر از ۲۴ ساعت و شدید تر شدن یا حاوی
خون بودن آن به پزشک خود مراجعه کنید.

احساس تهوع، درد شکمی و سوء هاضمه ممکن
است در مدت درمان با این دارو ایجاد شود، برای
بهبود آن مصرف غذاهای سبک و ساده و مصرف
دارو پس از وعده ی غذایی می تواند کمک کننده
باشد.

عوارض نادر سفالکسین

سرفه همراه با گلودرد، خشکی و التهاب چشم و
بروز لکه های قرمز پوستی.