

بیمارستان شهدای هفتم تیر

نکات مهم در استفاده از

سفکسیم cefixim

تهیه و تنظیم : بنین رضایی
رابط آموزش بیمار

بیمارستان شهدای هفتم تیر

داروهای ژنریک ایران

با مقدمه دکتر احمد رضا وهپور
تالیف : مرجان رسولی

سایت بیمارستان :

WWW.HOSPHT.IUMS.AC.IR

شماره های تماس :

55228581 -4

داخلی - 331

تاریخ تهیه : دی ماه 98

تاریخ بازنگری : فروردین 99

تاریخ ابلاغ : دی ماه 98

فرد تانید کننده :

عوارض داروئی :

درد شکم و کاهش اشتها - تهوع - استفراغ -
نفخ - سوء هاضمه عصبانیت و خستگی و
سرگیجه - بی حالی - کهیر راش - خارش -
خارش تناسلی - آنمی - آپلاستیک
در زمان شیر دهی سفکسیم قطع شود .

تجویز دارو :

این دارو باید 10-14 روز استفاده شود و
سوسپاسیون این دارو را تا 14 روز در یخچال
نگهداری می شود .
آموزش به بیمار و خانواده :
در صورتی که مبتلا به دیابت هستند لازم است
قند خون چک شود
اسهال مداوم به درمان را گزارش نمائید .
دارو را باید در زمان مشخص مصرف گردد.

بالغین : 200 mg 2 بار، در روز
اطفال بزرگتر از 6 ماه روزانه یکبار در روز
یا هر 12 ساعت

تداخل دارویی :

مصرف و همزمان با سالیسیلات 50%
میزان سفکسیم آزاد اضافه شود . سفکسیم
قادر به از بین بردن هلیکوباکتریپلوری
است

طیف درمانی : آنتی بیوتیک

اشکال دارویی :

Tab = 200 mg
Surp = 100 mg /150mg
Cap = 400mg /200mg

باکتری کش :

این دارو باکتری کش ، با مهار روی باکتری
اثر خود را اعمال می کند جذب این دارو با
معده خالی بهتر است دفع دارو بیشتر
ادراری و کمتر صفراوی است

موارد استفاده = عفونت ادراری - گوش
میانی - التهاب حنجره و التهاب لوزه و
سوزاک بدون عارضه و برونشیت حاد و
مزمن میباشد

--	--	--