

مرکز آموزشی- درمانی شهدای
هفت تیر

آموزش نحوه مصرف قرص
سیپروفلوکساسین

تهیه و تنظیم : واحد آموزش بیمار

سایت بیمارستان :

WWW.HOSPHT.IUMS.AC.IR

55237260

شماره های تماس :

55228581 -4

داخلی - 331

تاریخ تهیه خرداد 1400

تاریخ بازنگری خرداد 1401

منابع: رفرنس جامع فارماکولوژی داروهای ژنریک
ایران-انتشارات آبنوس(مؤلفین: سلیمان نادری-
ویداخانی-محمدادریس)

سيپروفلوكساسين

طبقه بندي دارو و عملکرد: سيپروفلوكساسين يك آنتي بيوتيك از دسته ي فلوروکينولون ها است که در بدن با باکتریها مبارزه مي کند. اين دارو رشد ميكروب را متوقف مي کند.

موارد مصرف: اين دارو براي درمان انواع مختلفي از عفونت هاي بلكتريايي (مانند عفونت استخوان، مفصل، پوست، عفونت ادراري، عفونت تنفسي، عفونت داخل شکم) به کار مي رود.

اشکال دارويي: قرص 250-500mg

مصرف دارو در بارداري و شيردهي: گروه C مي باشد. بدليل عبور دارو از جفت و ايجاد عوارض جانبي، مصرف آن در دوران بارداري توصيه نمي شود. در صورت ضرورت تجويز دارو در دوران شيردهي، توصيه مي شود که شيردهي متوقف شود.

موارد منع مصرف: سابقه ي واکنش هاي حساسيتي به اين دارو و يا ساير دارو هاي اين خانواده (لوفلوکساسين، افلوکساسين و...) - مصرف همزمان با تيزانيدين.

توجه ویژه: در صورت داشتن سابقه ي حساسيت به فلوروکينولون ها، بارداري، شيردهي، ابتلا به

ساير بيماريها (مثلا مشکلات استخوان و مفصل - مشکلات قلبي و فشارخون بالا - ديابت - بيماري کليه - تشنج و صرع - افسردگي) و يا مصرف ساير دارو ها قبل از اين دارو با پزشک خود مشورت کنيد.

نحوه ي مصرف دارو: * دارو را دقيقا طبق دستور پزشک مصرف کنيد.

* دارو را مي توان با يادون آب مصرف کرد (اما بهترين زمان مصرف دارو، 2 ساعت بعد از غذاست.)

* قرص را با مقدار زيادي آب مصرف کنيد و در زمان مصرف دارو، مایعات فراوان مصرف کنيد.

* دارو را براي مدت زمان تجويز شده، مصرف کنيد زيرا ممکن است علائم بيماري زودتر از درمان کامل عفونت، از بين برود و در صورت قطع دارو عفونت شديدتر و مقاوم به آنتي بيوتيك خواهد شد.

توجهات دارويي: * از مصرف همزمان دارو با محصولات لبني (شير - دوغ...) - دارو هاي آنتي اسيد (دارو ي درمان زخم معده) و ويتامين ها و مکمل هاي حاوي کلسيم - آهن - روي و منيزيم خودداري کنيد.

* مصرف اين دارو ممکن است سبب بروز سرگيجه يا خواب آلودگي شود.

* در صورت بروز درد، التهاب يا پارگي تاندون - علائم نوروپاتي محيطي مانند درد، سوزش، کزک شدن و خواب رفتگي اندام ها و نشانه هاي افت قند خون دارو را قطع نماييد و به پزشک خود اطلاع دهيد.

* بدليل احتمال بروز واکنش هاي حساسيت ناشي از نوردرطول درمان تا 5 روز بعد از درمان در معرض تابش آفتاب و نور مصنوعي (سولاريوم) قرار نگيريد. به محض مشاهده ي علائم مانند تاول، خارش، قرمز شدن پوست، دارو را قطع نماييد و به پزشک خود اطلاع دهيد

* در صورت فراموشي يك دوز، به محض ياد آوري، آن دوز را مصرف کنيد، مگر اينکه نزديک دوز بعدي دارو باشد.

* دارو ي خود را به ديگران توصيه نکنيد.

عوارض جانبي:

* دستگاه عصبی مرکزی: گيجي - خواب آلودگي - خستگي - بي خوابي - سردرد - هذيان

* دستگاه گوارش: نفخ - اسهال - استفراغ تهوع - يبوست

* دستگاه عضلانی: خشكي و درد مفاصل - درد گردن يا قفسه ي سينه - کمردرد

* پوست: راش - قرمزي - سوزش و خارش پوستي - تاول

--	--	--