

## تداخل اثر

-تداخل مهمی بین این دارو و سایر داروهای ضد صرع و تشنج مانند فنی توئین، کاربامازپین، والپروئیک اسید، فنوباریتال، لاموتریژین، گاباپنتین و پریمیدون دیده نشده است.

-تجویز همزمان این دارو با داروی متوتروکسات ممکن است سبب افزایش غلظت خونی متوتروکسات شود ، بنابراین در صورت مصرف همزمان این دو دارو میزان غلظت خونی متوتروکسات باید به دقت کنترل شود.

-مصرف همزمان این دارو با آنتی هیستامین ها ، بنزودیازپین ها ، اوپیوئیدها، ضد افسردگی های ۳ حلقه ای ، ممکن است سبب تشدید اثر آرام بخشی در بیمار گردد.

-تداخل اثبات شده ای بین لوتیراستام و الکل گزارش نشده است.

-میزان جذب این دارو تحت تاثیر غذا نمی باشد اما سرعت جذب آن ممکن است همراه با غذا کمی کاهش یابد.

### -تداخلات آزمایشگاهی:

-این دارو می تواند سبب کاهش کمی در مقادیر تست های زیر شود.

-هماتوکریت ، هموگلوبین ، تعداد نوتروفیل ها ، تعداد گلبولهای قرمز و سفید

# Levetiracetam<sup>®</sup> 500 mg

### \*موارد منع مصرف

-در صورت سابقه حساسیت به دارو یا سایر اجزای آن ، این دارو نباید مصرف شود.

-تجویز دارو در بیماران با نارسایی کبدی شدید و نیز در بیماران با اختلالات کلیوی و یا تحت دیالیز باید با احتیاط و تعدیل دوز صورت گیرد.

### \*عوارض جانبی

عوارض این دارو معمولاً خفیف تا متوسط می باشد . برخی عوارض مانند گیجی ، خواب آلودگی و احساس ضعف و خستگی ، معمولاً در ۴ هفته ابتدایی مصرف این دارو و یا هنگام افزایش دوز مصرفی بروز می یابند و به خود نیز با گذشت زمان کاهش می یابند.  
\*عوارض با شیوع کم:

عدم هماهنگی عضلات ، دوبینی ، عفونت ( تب ، لرز، سرفه، خشونت صدا، درد بدن ، ادرار سخت و دردناک )، تغییرات رفتاری و خلقی ( پریشانی ، عصبانیت ، افسردگی ، بی علاقهگی ، زوال شخصیت ،عدم پایداری عاطفی، احساس خشم ، اضطراب، فراموشی )، سینوزیت (تب ، خارش و آبریزش بینی ،سردرد، اختلالات تنفسی)



## بنام ایزد یکتا

### لوتیراستام

( Levetiracetam)

**دسته دارویی :** ضد تشنج ، ضد صرع ( مشتق

پیرولیدین) برند داروسازی امین: Levetiracetam

**شکل دارویی :** قرص 250، 500 و 1000 میلی

گرم باروکش فیلم (FC)

محلول خوراکی 500 میلی گرم در 5 میلی لیتر

**موارد مصرف** درمان کمکی صرع

( تشنج ) پارشیال در بزرگسالان و کودکان بالای ۴ سال

-داروی خط دوم در درمان تشنج های تونیک کلونیک ژنرالیزه. تشنج میوکلونیک در صرع جوانان-.

**مصرف دارو در دوران حاملگی و شیر دهی**

مطالعات کافی و کنترل شده ای در انسان وجود ندارد .لوتیراستام در FDA Pregnancy Category در گروه C قرار دارد.مصرف این دارو در دوران حاملگی و شیردهی ممنوع می باشد.

## در مورد قرص لوتیراستام چه

### میدانید؟

#### شرایط نگهداری دارو

قرص ها دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از 02 درجه سانتیگراد و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

محلول خوراکی دور از نور و در دمای کمتر از 02 درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود.

#### نوع بسته بندی دارو

فلاکون محتوی 50 عدد قرص

شیشه حاوی 120 میلی لیتر محلول خوراکی

## \*مصرف دوز بیش از حد دارو و درمان آن

در صورت مصرف اتفاقی دوز بیش از حد دارو ، بیمار سریعاً به مراکز ویژه درمانی منتقل شود .تجربه **overdose** با این دارو بسیار کم است .مهمترین عارضه بالینی گزارش شده احساس خواب آلودگی بوده است .

سایر عوارض با شیوع ناشناخته شامل پرخاشگری و تهاجم ، عصبانیت ، کما ، دپرسیون تنفسی (لب ها ، پوست و ناخن آبی یا رنگ پریده، تنفس سخت و نامنظم، سریع، کند و کم عمق، کوتاهی تنفس)، بی خوابی و سرگیجه

درمان : آنتی دوت اختصاصی برای اوردوز لوتیراستام وجود ندارد.

برای کاهش جذب، در صورت هوشیار بودن بیمار باید القای استفراغ یا لاواژ معدی انجام شود، جهت افزایش دفع نیز، همودیالیز استاندارد به ویژه در افراد با شرایط بالینی خاص و یا افراد با اختلالات کلیوی توصیه می شود .به این وسیله حدود 50 % دارو طی 4 ساعت از بدن خارج می گردد .علائم حیاتی و شرایط بالینی بیمار باید به دقت کنترل شود.

بیمارستان هفتم تیر، ری  
ICU 2  
تهران ، ری، خیابان شهید  
رجایی

تلفن:

55228580

55228581

55228582

منابع:

1. <http://www.aminpharma.com>
2. <http://aminpharma.com/wp-content/uploads/2018/08/%D9%84%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%85.pdf>

