

مرکز آموزشی - درمانی
شهادی هفتم تیر

نکات مهم در استفاده از

پنتاپرازول
pantaprazol

تهیه و تنظیم : رضیه رضاقلی
رابط آموزش بیمار

داروهای ژنریک ایران

تالیف : رامین خدام

سایت بیمارستان :

WWW.HOSPHT.IUMS.AC.IR

55237260

شماره های تماس :

55228581 -4

داخلی - 331

تاریخ تهیه : فروردین 98

تاریخ بازنگری : مهر 99

تاریخ ابلاغ : اردیبهشت 98

فرد تانید کننده :

داروی پنتاپرازول :

اشکال دارویی :

قرص : 20 میلی گرم - 40 میلی گرم
کپسول : 15 میلی گرمی - 20 میلی گرمی و 40 میلی گرمی
آمپول : 40 میلی گرمی

موارد مصرف دارویی :

40 میلی گرم از راه خوراکی یکبار در روز
به مدت 8 هفته با نظر پزشک و در صورت
عدم بهبودی با هماهنگی پزشک معالج
ادامه می یابد .

موارد منع مصرف این دارو :

دوران شیردهی - دوران حاملگی -
کودکان

تداخلات دارویی :

مصرف همزمان این دارو با وارفارین
(ضدلخته خون) باعث افزایش
خونریزی می شود.

مصرف همزمان این دارو با دیازپام و
فنی توئین باعث افزایش سطح خونی
این دارو می شود .

عوارض ناخواسته این دارو :

سردرد - بی خوابی - درد شکم -
اسهال و بثورات جلدی می شود .

"آموزش به بیمار"

- در صورت احساس بهبودی دوره درمان کامل شود .
 - دارو طبق تجویز پزشک مصرف شود .
 - از مصرف الکل و آسپرین و سایر داروهای ضد التهابی اجتناب شود .
 - در صورت بروز اسهال شدید - مدفوع سیاه و قیری و درد شکم به پزشک اطلاع داده شود .
- جذب دارو سریع بوده و در کبد متابولیزه می شود .
- دفع دارو به طور عمده از راه ادرار صورت می گیرد و باقیمانده دارو از راه مدفوع دفع می شود .

--	--	--